



Rheinland-Pfalz (Kreisebene)

Diagnose	676	A - OPs	86	B - OPs	70
	875		165		108
	+ 30 %		+ 122 %		+ 63 %
		C - OPs	218		
			226		
			+ 8 %		

Deutschland (Kreisebene)

Diagnose	580	A - OPs	84	B - OPs	74
	749		160		106
	+ 30 %		+ 121 %		+ 50 %
		C - OPs	198		
			214		
			+ 11 %		

Altenkirchen

Diagnose	698	A - OPs	87	B - OPs	74
	847		195		96
	+ 21 %		+ 122 %		+ 31 %
		C - OPs	260		
			290		
			+ 12 %		

Westerwaldkreis

Diagnose	728	A - OPs	90	B - OPs	84
	1061		164		114
	+ 46 %		+ 81 %		+ 36 %
		C - OPs	276		
			328		
			+ 19 %		

Neuwied

Diagnose	871	A - OPs	110	B - OPs	93
	1164		163		107
	+ 34 %		+ 48 %		+ 16 %
		C - OPs	390		
			256		
			- 34 %		

Ahrweiler

Diagnose	837	A - OPs	81	B - OPs	71
	1015		88		80
	+ 21 %		+ 9 %		+ 13 %
		C - OPs	260		
			159		
			- 39 %		

Mayen-Koblenz

Diagnose	755	A - OPs	81	B - OPs	107
	997		116		108
	+ 32 %		+ 43 %		+ 1 %
		C - OPs	310		
			265		
			- 15 %		

Koblenz

Diagnose	654				
	838				
	+ 28 %				
	A - OPs	57			
		112			
		+ 97 %			
	B - OPs	83			
		110			
		+ 32 %			
	C - OPs	308			
		268			
		- 13 %			

Rhein-Lahn-Kreis

Diagnose	755	A - OPs	60	B - OPs	87
	1016		194		139
	+ 35 %		+ 223 %		+ 60 %
		C - OPs	255		
			305		
			+ 19 %		

Cochem-Zell

Diagnose	824	A - OPs	55	B - OPs	78
	1026		111		101
	+ 25 %		+ 102 %		+ 29 %
		C - OPs	283		
			242		
			- 14 %		

Rhein-Hunsrück-Kreis

Diagnose	799	A - OPs	39	B - OPs	75
	1115		161		109
	+ 40 %		+ 315 %		+ 46 %
		C - OPs	197		
			212		
			+ 7 %		

Mainz

Diagnose	469	A - OPs	68	B - OPs	45
	486		178		123
	+ 4 %		+ 159 %		+ 176 %
		C - OPs	152		
			154		
			+ 1 %		

Bad Kreuznach

Diagnose	785	A - OPs	66	B - OPs	102
	1220		265		145
	+ 56 %		+ 303 %		+ 43 %
		C - OPs	173		
			260		
			+ 51 %		

Birkenfeld

Diagnose	851	A - OPs	113	B - OPs	95
	1460		288		160
	+ 71 %		+ 155 %		+ 68 %
		C - OPs	242		
			295		
			+ 22 %		

Diagnose
Häufigkeit in Krankenhäusern (je 100.000 Einwohner)

- 2007/2008
- 2014/2015
- relative regionale Veränderung in Prozent

Erfasst wurden die häufigsten stationären Wirbelsäulenbeschwerden: Spondylose (Code M47, degenerative Wirbelsäulenerkrankung), sonstige Spondylopathien (Code M48, Wirbelsäulendegeneration), sonstige Bandscheibenschäden (Code M51), Rückenschmerzen (Code M54).

OPS (Operationen und Prozeduren)
Häufigkeit (je 100.000 Einwohner)

- 2007/2008
- 2014/2015
- relative regionale Veränderung in Prozent

A: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals (Druckentlastung des Rückenmarks)

B: Spondylodese (Versteifung von mehreren Wirbelkörpern an der Hals-, Brust- und/oder Lendenwirbelsäule)

C: Chirurgisches Entfernen von erkranktem Bandscheibengewebe